

FICHA DE INFORMAÇÕES E DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

SOLUÇÃO
ANTISSÉPTICA BUCAL

FlúorPlak

Sem Álcool

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0,12% + FLUORETO DE SÓDIO 0,05%



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto:

FLUORPLAK SEM ÁLCOOL SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA BUCAL
Gluconato de Clorhexidina 0,12% + Fluoreto de Sódio 0,05%

Processo N.º: 25351.411257/2009-44

Apresentações do produto:

Volumes:

500ml
1,1L

Código EAN:

7898920385 52 8
7898920385 54 2

PRINCÍPIO ATIVO:

Solução com Gluconato de Clorhexidina 0,12%. + Fluoreto de Sódio

AÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO:

- Antisséptico com eficácia superior a maioria dos agentes antibacterianos.
- Antisséptico de ação prolongada, agente antimicrobiano de amplo espectro.

*'A característica fundamental da eficácia da clorhexidina é sua substantividade, podendo ficar na cavidade bucal por até 12 horas' **

* SINNES, E.P. Et al. Controle Químico da Placa Bacteriana. In: Prevenção Clínica Odontológica. São Paulo, Artes Médicas, 1997.

FLUORPLAK SEM ÁLCOOL - SEM CORANTE

- Flúorplak Sem Álcool é uma solução Antisséptica Bucal sabor menta. **Sem Corante**, pronta para uso. Ideal para quem usa Aparelho Ortodôntico. **Contém Gluconato de Clorhexidina a 01,2%**, agente antimicrobiano de amplo espectro, capaz de reduzir significativamente o número de microrganismos na saliva imediatamente após o uso, e **Fluoreto de Sódio a 0,05%** indicado como auxiliar na prevenção da cárie dental.

COMPOSIÇÃO

Clorhexidine Diguconate, Sodium Fluoride, Polysorbate 20, Propilene Glicol, Sorbitol, Sodium Saccharin, Flavor, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Benzoate, Aqua. **Contém Fluoreto de Sódio 0,05% (227 ppm).**

INDICAÇÃO

É indicado como antisséptico bucal, auxiliando na prevenção da formação da cárie, da placa bacteriana dental, gengivite e mau hálito. Podendo fazer parte de um programa controlado pelo Cirurgião Dentista.

MODO DE USAR

Bochechar 20ml de FLUORPLAK SEM ÁLCOOL sem diluir, pela manhã e a noite, após a higiene bucal ou conforme indicação do Cirurgião Dentista. Ficar 30 minutos sem comer, beber ou enxaguar a boca.

PRECAUÇÕES

Podem ocorrer manchas nos dentes ou nas restaurações após o uso contínuo e prolongado do produto. As manchas são externas ao esmalte dental, não afetam a saúde, podendo ser removidas com facilidades pelo dentista. Pode ocorrer diminuição no paladar, que se recupera facilmente após a interrupção do uso do produto. Não ingerir o produto. Manter fora do alcance das crianças.

RESTRIÇÕES DE USO

Não deve ser indicado a pessoas com hipersensibilidade ou reações alérgicas a Clorhexidina. Não utilizar em crianças menores de 6 anos de idade.

FABRICADO POR

REYMER DO BRASIL - Indústria e Comércio Prod. Quim. Ltda.
Rua São Francisco QD 02 Lt 20 CEP.: 74980-110
Aparecida de Goiânia CNPJ: 00.075.112/0001-01
Tel 62 3094 3850 sac@reymer.com.br www.reymer.com.br
Responsável Técnico: Silviane Borges Camargo - CRF-GO 2035
A.F.E. N.º : 2.03489-7

REYMER[®]
Prevenção e Higiene em 1º Lugar.