

FICHA DE INFORMAÇÕES E DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto:

PERIOPLAK SEM ÁLCOOL SOLUÇÃO ANTISSEPTICA BUCAL

Registro M.S.: 2.3489.0009

Processo n.º: 25351.375619/2009-20

Apresentações do produto:

Volumes:	Código EAN:
100ml	7898920385 09 2
250ml	7898920385 10 8
500ml	7898920385 12 2
1L	7898920385 13 9
1,1L	7898920385 14 6
Kit c/ 1,1L	7898920385 17 7
Kit Econômico 2,2L	7898942197 01 7

PRINCÍPIO ATIVO:

Solução com Gluconato de Clorhexidina 0,12%.

AÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO:

- Antisséptico com eficácia superior a maioria dos agentes antibacterianos.
- Antisséptico de ação prolongada.

*'A característica fundamental da eficácia da clorhexidina é sua substantividade, podendo ficar na cavidade bucal por até 12 horas' **

* SINNES, E.P. Et al. Controle Químico da Placa Bacteriana. In: Prevenção Clínica Odontológica. São Paulo, Artes Médicas, 1997.

PERIOPLAK SEM ÁLCOOL

- Não contém Álcool em sua formulação.
- Reduz significativamente o número de microrganismos na saliva após o uso, por seu princípio ativo ter uma ação prolongada e maior atividade antimicrobiana
- Perfeito equilíbrio em sua formulação, com agradável sabor de menta, facilitando a adesão ao uso do produto.
- Previne o mau hálito e proporciona uma higiene bucal mais completa.

COMPOSIÇÃO

Clorhexidine Digluconate, Polysorbate 20, Propliene Glycol, Glycerin, Sorbitol, Sodium Saccharin, Flavor, Methylpraben, Propylpraben, Sodiun Benzoate, CI 42090, Water.

INDICAÇÃO

É indicado como antisséptico bucal, auxiliando na prevenção da placa bacteriana, da gengivite e do mau hálito. Podendo fazer parte de um programa controlado pelo Cirurgião Dentista.

MODO DE USAR

Bochechar 15ml de PERIOPLAK SEM ÁLCOOL sem diluir, pela manhã e a noite, após a higiene bucal ou conforme indicação do Cirurgião Dentista.

PRECAUÇÕES

Podem ocorrer manchas nos dentes ou nas restaurações após o uso contínuo e prolongado do produto. As manchas são externas ao esmalte dental, não afetam a saúde, podendo ser removidas com facilidades pelo dentista. Pode ocorrer diminuição no paladar, que se recupera facilmente após a interrupção do uso do produto. Não ingerir o produto. Manter fora do alcance das crianças.

RESTRIÇÕES DE USO

Não deve ser indicado a pessoas com hipersensibilidade ou reações alérgicas a Clorhexidina.

FABRICADO POR

REYMER DO BRASIL - Indústria e Comércio Prod. Quim. Ltda.
Rua São Francisco QD 02 Lt 20 CEP.: 74980-110
Aparecida de Goiânia CNPJ: 00.075.112/0001-01
Tel 62 3094 3850 sac@reymer.com.br www.reymer.com.br
Responsável Técnico: Silviane Borges Camargo - CRF-GO 2035
A.F.E. N.º: 2.03489-7

REYMER[®]
Prevenção e Higiene em 1º Lugar.